



فاویسم

بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از تریخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:

مراقبت در منزل :

- رژیم غذایی کودک شما عادی است جز اینکه مصرف باقلا به شکل خام یا پخته مجاز نیست و تا حد امکان از تماس کودک با پوست باقلا نیز خودداری کنید. حتی کودک فاویسمی خود را به مزارع باقلا هم نبرید.
- اگر به کودک فاویسمی خود شیرمی دهید شما هم باید از مصرف باقلا خودداری کنید و حتی اگر یک دانه هم مصرف کردید باید تا ۳ روز شیر مادر را قطع کنید.
- ممکن است کودک شما به دلیل از دست دادن خون تا مدتی سرگیجه و ضعف داشته باشد، مراقب باشید زمین نخورد.
- اگر کودکی نیاز به داروی کوتریموکسازول داشت و مبتلا به فاویسم بود، باید این دارو تحت نظر پزشک و با احتیاط مصرف شود.
- در صورت بروز تب، کودک را با آب ولرم تن (پا) شویید. از شیاف استامینوفن استفاده و پوشش وی را کم کنید.
- هیچ دارویی را بدون نظر پزشک به بیمار خود ندهید و در صورت مراجعه به پزشک حتماً به وی بگویید کودک کتان فاویسمی است.
- در صورت مشاهده یکی از علائم فاویسم به بیمار خود مایعات شیرین و بیرنگ مانند آب بسیار و یا آب انگور بدهید و به درمانگاه یا بیمارستان مراجعه کنید.
- دقت کنید بیمار شما در معرض برخی مواد شیمیایی مانند نفتالین، بنزن و حشره کش ها قرار نگیرد.
- بیمار شما نمی تواند و نباید خون خود را به دیگران اهدا کند.
- لیست داروها به صورت کتبی به شما داده خواهد شد. از مصرف خودسرانه دارو یا قطع دارو خودداری کنید.

در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید

- تب، تهوع، استفراغ، دل درد، اسهال، تیره رنگ شدن ادرار، رنگ پریدگی، سرگیجه، کاهش ادرار و طپش قلب
- کم خونی شدید، اسهال و استفراغ، تهوع، زردی سفید چشم، زردی پوست و خونی شدن رنگ ادرار
- سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی



شناسنامه فرم آموزش پس از تریخیص کد (۰۵) ۹۹

عنوان	فاویسم
منبع	برونر و سودارث
تهیه کننده	سوپروایزر آموزش به بیمار الهام سرتکی
پزشک نایب کننده	دکتر صالح - فوق تخصص خون و سرطان
تاریخ بازنگری	بهار ۱۴۰۲