



مسمومیت با اپیوم

بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:

مراقبت در منزل :

- از نگهداری شربت متادون، حتی در دوزهای بسیار پایین، در شیشه‌های غیر دارویی (نظیر بطری نوشابه و ...) و شیشه‌های بدون برچسب حاوی نام دارو اکیداً خودداری کنید.
- در صورت امکان، تحویل دوز مورد نیاز به صورت روزانه در مراکز ترک اعتیاد انجام پذیرد.
- شیشه‌های حاوی متادون می‌بایست دارای برچسب مخصوص هشدار دهنده حاوی نام فرآورده و توضیحات لازم مربوط به نحوه مصرف دارو باشند.
- از آنجایی که طعم شربت متادون شیرین است و مصرف کنندگان دارو در برخی موارد آن را به همراه چای یا نوشابه مصرف می‌نمایند از نگهداری دارو در یخچال یا کنار سایر نوشیدنی‌ها خودداری کنید.
- دارو را دور از دسترس اطفال و در قفسه‌های قفل دار نگهداری کنید.
- از مصرف دارو در زمان حضور کودک خودداری کنید.
- دارو را در ظرف‌هایی با درب مقاوم که کودک قادر به باز کردن آن نباشد نگهداری کنید.
- به کودکانی که متوجه می‌شوند، خطرات مصرف آن را بگویید.
- به کودک خود مایعات فراوان بدهید تا دارو هرچه سریع‌تر دفع شود.
- ممکن است یبوست ایجاد شود بنابراین با مصرف مواد غذایی پرفیبر مانند سبزیجات و میوه می‌توان از یبوست جلوگیری کرد.
- ممکن است تا مدتی کودک بی حال و دچار سرگیجه باشد در این زمان مراقب باشید تا سقوط نکند و زمین نخورد.
- در زمان مشخص شده توسط پزشک جهت پیگیری درمان به بیمارستان مراجعه کنید.
- در شروع درمان و نیز در تمام طول دوره مصرف دارو، علائم مسمومیت با متادون را سوال کنید.

در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید

- اختلال هوشیاری، اختلالات تنفسی، نبض ضعیف، اختلالات گوارشی همچون تهوع و استفراغ و نیز سفتی و تکانه‌های عضلانی

سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی



شناسنامه فرم آموزش پس از ترخیص کد (۰۶) ۹۹

عنوان	مسمومیت با اپیوم
منبع	برونر- Family Doctor.org
تهیه کننده	سوپروایزر آموزش به بیمار الهام سرتکی
پزشک تایید کننده	دکتر استقامتی (فوق تخصص کلیه و مجاری ادرار در کودکان)
تاریخ بازنگری	بهار ۱۴۰۲