



بیماری کاوازاکی

گروه هدف: بیماران و همراهان



کد پمفلت بیماری کاوازاکی (19) 1403

گردداورنده	الهام سرتکی (سوپروایزر آموزش سلامت)
استاد علمی	دکتر رحمتی (متخصص اطفال و فوق تخصص بیماری های عفونی اطفال)
منبع	www://pro.uptodatefree.ir/

بیماری کاوازاکی چیست؟ بیماری کاوازاکی باعث التهاب در رگ های خونی خاصی در بدن می شود. علائم اصلی تب و تورم و قرمزی در نواحی دارای التهاب مانند چشم ها، لب ها، دست ها و پاها است. این بیماری می تواند با علائمی شبیه سرماخوردگی یا مشکلات گوارشی شروع شود. بیشتر در کودکان زیر ۵ سال شایع است.

علت بیماری کاوازاکی چیست؟ علت شناخته شده نیست. اما طبق یافته های علمی که از فردی به فرد دیگر سرایت نمی کند.

علائم بیماری کاوازاکی چیست؟ علائم عبارتند از:

- تب
 - قرمزی در قسمت سفید چشم
 - لب های ترک خورده و قرمز
 - زبان قرمز و متورم
 - بثورات - بثورات اغلب در ناحیه تناسلی شروع می شود. همچنین می تواند در کمر، سینه، شکم، بازوها و پاها باشد.
 - غدد متورم در گردن
 - پوست متورم و قرمز در کف دست ها و کف پاها. پوست نوک انگشتان دست و پا پس از چند روز پوسته می شود.
- در موارد نادر، کودکانی که به بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ (COVID-19) مبتلا می شوند، ممکن است در سراسر بدن دچار التهاب شوند. پزشکان به این «سندرم التهابی چند سیستمی در کودکان» می گویند. اگر به سرعت درمان نشود می تواند باعث آسیب اندام شود. علائم این بیماری می تواند شبیه بیماری کاوازاکی باشد.

آیا آزمایشی برای بیماری کاوازاکی وجود دارد؟ کودکان مبتلا به بیماری کاوازاکی معمولاً به چند آزمایش نیز نیاز دارند. این موارد می تواند شامل موارد زیر باشد:

- آزمایش خون
- آزمایش ادرار
- اکوکاردیوگرافی

بیماری کاوازاکی چگونه درمان می شود؟ درمان بیماری کاوازاکی شامل موارد زیر است:

- گلوبولین ایمنی (همچنین به نام IVIG) - این درمان از طریق تزریق وریدی انجام می شود. این کار در بیمارستان در مدت زمان ۸ تا ۱۲ ساعت انجام می شود.
- آسپرین

اگر کودک شما IVIG دریافت کند، ممکن است حداقل یک سال نتواند واکسن های خاصی (مانند سرخک یا آبله مرغان) را دریافت کند. این به این دلیل است که واکسن ها ممکن است در این مدت برای جلوگیری از بیماری به خوبی عمل نکنند. در برخی از کودکان، IVIG ممکن است به خوبی عمل نکنند. این کودکان ممکن است با استروئیدها همراه با IVIG و آسپرین درمان شوند.

کودکان مبتلا به بیماری کاوازاکی که تحت درمان قرار نمی گیرند در معرض خطر مشکلات قلبی هستند. این به این دلیل است که آنها می توانند رگ های خونی قلب را متورم کنند. اما تنها تعداد کمی از کودکان آسیب دائمی قلبی ناشی از بیماری