



انواژیناسون

گروه هدف : بیمار و خانواده



کد پمفلت انواژیناسون (۰۱) ۱۴۰۵


گردآورنده	الهام سرتکی (سوپروایزر آموزش سلامت)
استاد علمی	دکتر بهناز دربان (متخصص کودکان و نوزادان و فوق تخصص گوارش کودکان)
منبع	www://pro.uptodatefree.ir/

انواژیناسیون

انواژیناسیون حالتی است که در آن بخشی از روده کوچک داخل قسمتی که جلو قرار گرفته است می لغزد. در مرحله بعد روده های در هم رفته دچار تورم می شوند و این دو با هم منجر به انسداد روده می گردند.

متعاقباً برای رفع انسداد ، روده ها دچار انقباض می شوند . کودک شیر خوار بر اثر شروع انقباضات ، ناگهان گریه می کند و ممکن است دچار استفراغ، رنگ پریدگی و تب شود . اما در فاصله بین انقباضات ، بی حال و خواب الود به نظر می رسد . اگر چه در چند ساعت اول ، مدفوع او ظاهر طبیعی دارد ، اما به تدریج به علت تورم جدار روده و فشار در آن ناحیه ، مخاط خونریزی کرده و مخلوط خون و مخاط به صورت ژله قرمز رنگی دفع می شود .

دلیل پیدایش انواژیناسیون معلوم نیست و می تواند در هر سن و سالی رخ دهد . اما اغلب اوقات در ۳ ماهگی تا ۳ سالگی دیده می شود .



ابتدا چکار باید بکنیم ؟

اگر کودک شما مکرراً دچار حملات اسپاسمی می شود ، داد و فریاد می کند و پاهایش را از شدت درد به شکم می چسباند ، اما بین حملات بی حال به نظر می رسد ، فوراً با پزشک مشورت کنید .

- مدفوع کودکتان را از نظر مخاط و خون بررسی کنید .
- در بین حملات ، دمای بدن کودک را از نظر تب اندازه گیری کنید .

ایا مشورت با دکتر لازم است ؟

اگر کودک شما در معرض حملات پی در پی شکمی و انقباض است و یا در مدفوع کودک متوجه خون و مخاط شدید ، فوراً به پزشک مراجعه کنید .

علائم بیماری

درد شدید شکم ، احتمالاً همراه با جیغ و فریاد ، استفراغ ، رنگ پریدگی ، تب مختصر ، مدفوع حاوی خون و مخاط که شبیه ژله قرمز رنگ است .

تشخیص بیماری

بررسی های تشخیصی ممکن است شامل آزمایش خون ، عکس برداری اشعه ایکس از شکم و روده ها (با کمک تنقیه باریوم) باشد .

- ♦ معمولاً درفتگی روده با کمک رادیولوژیست ، با تنقیه رفع می شود . گاهی جراحی برای تصحیح این مشکل از طریق بیرون دادن قسمت فرورفته انجام می گیرد .
- ♦ معمولاً دارویی برای این اختلاف مورد نیاز نیست ، مگر اینکه عفونت بروز کند . در این صورت ممکن است آنتی بیوتیک تجویز شود .
- ♦ برای این بیماری ، از درمان ها یا داروهای خانگی ، مثل مسهل ها ، استفاده نکنید . این داروها ممکن است خطرناک باشند .
- ♦ کودک باید تا زمانی که انسداد بر طرف نشده است در تخت استراحت کند . پس از رفع انسداد ، کودک می تواند تدریجاً فعالیت هایش را از سر بگیرد .



رژیم غذایی

هیچگاه به کودکی که علائم انسداد روده غذا ندهید . تا زمانی که انسداد برطرف نشده باشد ، باید به کودک سرم داد. پس از بهبودی ، رژیم خاصی مورد نیاز نیست .

در این شرایط به پزشک خود مراجعه نمایید :

اگر کودک شما علائم انسداد روده دارد ، انسداد روده ناگهان از یک بیماری قابل معالجه به یک بیماری تهدید کننده جان کودک ، تبدیل می شود .



آیا بیماری خطرناک است ؟

انواژیناسیون اگر به ندرت اتفاق می افتد ، اما یک بیماری خطرناک است و اگر درمان نشود می تواند کشنده باشد .

مراقبت های بعد از عمل جراحی

شروع تغذیه با نظر پزشک بیماری باشد . معمولاً ۱۲ تا ۲۴ ساعت بعد از عمل جراحی شروع تغذیه با خوردن مایعات می باشد و بعد از آن بیماران محدودیت خوردن غذا ندارند .

پیشگیری

اگر علائم گفته شده ظاهر شدند ، کودکان را به دقت تحت نظر بگیرید . با مراجعه به پزشک در همان مراحل اولیه ، از بروز عوارض آن پیشگیری به عمل آورید . راه خاص دیگری برای پیشگیری وجود ندارد.

